

УДК 517.9

Методы построения приближенных автомодельных решений нелинейных уравнений теплопроводности. II

Галактионов В. А., Самарский А. А.

Настоящая работа служит продолжением статьи [1]. Мы будем рассматривать следующие краевые задачи для параболического уравнения типа нелинейной теплопроводности

$$\frac{\partial u}{\partial t} = A(u) = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(u) \frac{\partial u}{\partial x} \right),$$

$$k(u) > 0, \quad u > 0, \quad k \in C^2((0, +\infty)) \cap C([0, +\infty)), \quad (1)$$

$$u(0, x) = u_0(x) \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}_+^1, \quad u_0 \in C(\mathbb{R}_+^1), \quad (2)$$

$$\sup u_0 < +\infty, \quad k(u_0) \frac{\partial u_0}{\partial x} \in C(\mathbb{R}_+^1), \quad \text{mes supp } u_0 < +\infty,$$

с одним из граничных режимов

$$u(t, 0) = \kappa_+(t) > 0, \quad t > 0, \quad \kappa_+ \in C^2(\mathbb{R}_+^1), \quad (3)$$

$$u(t, 0) = \kappa_-(t) > 0, \quad t \in (0, 1), \quad \kappa_- \in C^2(0, 1), \quad (3')$$

где монотонно возрастающие функции κ_{\pm} таковы, что $\kappa_+(t) \rightarrow +\infty$ при $t \rightarrow +\infty$ и $\kappa_-(t) \rightarrow +\infty$ при $t \rightarrow 1^-$ (в последнем случае функция κ_- изменяется в режиме с обострением).

Для определения асимптотического поведения решений задач (1)–(3), (1)–(3') используются приближенные автомодельные решения (п. а. р.) уравнения (1), которые ему не удовлетворяют, но к которым решение рассматриваемых задач асимптотически сходится. В § 4 построены новые (по сравнению с [1]), классы п. а. р. уравнения (1) с коэффициентами k существенно нестепенного вида. В § 5 рассматриваются п. а. р. линейного уравнения теплопроводности, которому отвечает $k(u) \equiv 1$ в (1).

Введем некоторые обозначения. Через $\|\cdot\|_C$ обозначим норму в $C(\mathbb{R}_+^1)$ и будем писать, что функция $v(t, x) \in C(\mathbb{R}_+^1)$, если при всех допустимых $t > 0$

$$\|v(t, \cdot)\|_C \equiv \sup_{x \in \mathbb{R}_+^1} |v(t, x)| < +\infty.$$

Гильбертово пространство $L^2(\mathbb{R}_+^1)$ снабжается скалярным произведением и нормой, определяемыми соответственно по формулам

$$(u, v) = \int_0^{+\infty} u(x)v(x) dx, \quad \|u\|_2 = (u, u)^{1/2}.$$

§ 4. Приближенные автомодельные решения в вырожденном случае

В этом параграфе для широкого класса уравнений (1) с нестепенными нелинейностями будут построены замкнутые системы п. а. р., удовлетворяющих некоторым нелинейным уравнениям первого порядка.

Построение п. а. р. в вырожденном случае будем проводить при следующих ограничениях на коэффициент k :

$$\int_0^{+\infty} [k(s)/(s+1)] ds = +\infty, \quad (4.1)$$

$$[k(s)/k'(s)]' \rightarrow +\infty, \quad s \rightarrow +\infty. \quad (4.2)$$

Условие (4.1) накладывает ограничение «снизу» на характер поведения функции $k(s)$ при больших s , условие (4.2) — ограничение «сверху».

В дальнейшем нам понадобится функция $E(s)$, определяемая равенством

$$\int_0^{E(s)} [k(\eta)/(\eta+1)] d\eta = s, \quad s > 0. \quad (4.3)$$

Функция E является положительной и возрастающей в \mathbf{R}_+^1 ,

$$E \in C^3((0, +\infty)) \cap C([0, +\infty)), \quad E(0) = 0, \quad E(+\infty) = +\infty$$

(последнее обеспечивается условием (4.1)). Поэтому E осуществляет взаимно-однозначное отображение $\bar{\mathbf{R}}_+^1 \rightarrow \bar{\mathbf{R}}_+^1$ и существует E^{-1} — функция, обратная к E .

Точная оценка скорости сходимости к п. а. р., построенным ниже, определяется с помощью функции

$$\omega(s) = \max_{\eta \in [0, s]} k(E(\eta)). \quad (4.4)$$

Из условия (4.2) следует, что

$$\omega(s)/s \rightarrow 0, \quad s \rightarrow +\infty. \quad (4.5)$$

В таблице 8 указаны некоторые характерные коэффициенты $k(u)$, удовлетворяющие условиям (4.1), (4.2). Там же приведены главные члены асимптотических разложений функций $E(u)$ в (4.3) при $u \rightarrow +\infty$ (в явном виде E часто не вычисляется). Они понадобятся для определения конкретного вида граничных режимов $\kappa_{\pm}(t)$.

Таблица 8

$k(u)$	$E(u)$
$\exp[\ln^\alpha(1+u)], 0 < \alpha < 1$	$\cong \exp \left\{ \ln^{1/\alpha} u \left[1 + \frac{\alpha-1}{\alpha^2} \frac{\ln \ln u}{\ln u} \right] \right\}$
$\ln^\alpha(1+u), \alpha > 0$	$\cong \exp \{ [(1+\alpha) u]^{1/(1+\alpha)} \}$
$\ln[1 + \ln(1+u)]$	$\cong \exp \left[\frac{u}{\ln u} \right]$
1	$\cong \exp u$
$\{1 + \ln[1 + \ln(1+u)]\}^{-1}$	$\cong \exp [u \ln u]$
$\{1 + \ln^\alpha(1+u)\}^{-1}, 0 < \alpha < 1$	$\cong \exp \{ [(1-\alpha) u]^{1/(1-\alpha)} \}$
$\{1 + \ln(1+u)\}^{-1}$	$\cong \exp [\exp u]$
$\{1 + \ln(1+u)\}^{-1} \{1 + \ln[1 + \ln(1+u)]\}^{-1}$	$\cong \exp \{ \exp [\exp u] \}$

Будет показано, что в сделанных предположениях при достаточно произвольных граничных режимах решения рассматриваемых задач сходятся к п. а. р. $u_a(t, x)$ следующего уравнения первого порядка типа Гамильтона — Якоби

$$\frac{\partial v}{\partial t} = H_k(v) = \frac{k(v)}{v+1} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2. \quad (4.6)$$

Тем самым функции u_a будут п. а. р. исходного параболического уравнения (1).

Нам понадобятся три вида точных инвариантных решения уравнения (4.6), на основе которых будут строиться п. а. р. рассматриваемой задачи:

$$\begin{aligned} \text{А. } v_A(t, x) &= E[(1+t)^m \theta_a(\hat{x}/(1+t)^{(1+m)/2})], \\ (t, x) &\in \mathbf{R}_+^1 \times \mathbf{R}_+^1, \quad m = \text{const} > 0, \end{aligned} \quad (4.7)$$

$$\begin{aligned} \text{Б. } v_A(t, x) &= E[(1-t)^n \theta_a(x/(1-t)^{(1+n)/2})], \\ (t, x) &\in (0, 1) \times \mathbf{R}_+^1, \quad n = \text{const} < 0, \end{aligned} \quad (4.8)$$

$$\begin{aligned} \text{В. } v_A(t, x) &= E[\exp(t) \theta_a(x/\exp(t/2))], \\ (t, x) &\in \mathbf{R}_+^1 \times \mathbf{R}_+^1. \end{aligned} \quad (4.9)$$

Неотрицательные функции $\theta_a(\xi)$ удовлетворяют следующим обыкновенным дифференциальным уравнениям, которые получаются после подстановки выражений (4.7) — (4.9) в (4.6):

$$\text{А. } (\theta'_a)^2 + \frac{1+m}{2} \theta'_a \xi - m\theta_a = 0, \quad \xi \in \mathbf{R}_+^1, \quad (4.10)$$

$$\text{Б. } (\theta'_a)^2 - \frac{1+n}{2} \theta'_a \xi + n\theta_a = 0, \quad \xi \in \mathbf{R}_+^1, \quad (4.11)$$

$$\text{В. } (\theta'_a)^2 + \frac{1}{2} \theta'_a \xi - \theta_a = 0, \quad \xi \in \mathbf{R}_+^1, \quad (4.12)$$

а также краевым условиям

$$\theta_a(0) = 1, \quad \theta_a(+\infty) = 0. \quad (4.13)$$

Нам будет удобно записывать граничные режимы $\kappa_{\pm}(t)$ (см. (3), (3')) в виде

$$\kappa_{\pm}(t) = E[\psi_{\pm}(t)], \quad (4.14)$$

где $\psi_{\pm}(t)$ — известные монотонно возрастающие функции.

П. а. р. уравнения (4.6) (и исходного уравнения (1)) будем искать в следующем виде:

$$u_a(t, x) = E[\psi_{\pm}(t) \theta_a(\xi)], \quad \xi = \frac{x}{\varphi(t)}. \quad (4.15)$$

Здесь $\theta_a(\xi)$, $\varphi(t)$ — неизвестные функции, подлежащие в дальнейшем определению. При этом предполагаем выполненными условия (4.13), так что $u_a(t, 0) \equiv u(t, 0) = E[\psi_{\pm}(t)]$. Из (4.15) следует, что функция $U_a = E^{-1}(u_a) = \psi_{\pm}(t) \theta_a(\xi)$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial U_a}{\partial t} = \psi'_{\pm}(t) \theta_a - \left(\psi_{\pm} \frac{\varphi'}{\varphi} \right) (t) \frac{d\theta_a}{d\xi} \xi \quad (4.16)$$

или эквивалентному ему уравнению

$$\frac{\partial U_a}{\partial t} = \left(\frac{\psi_{\pm}'}{\psi_{\pm}} \right) (t) U_a - \left(\frac{\varphi'}{\varphi} \right) (t) \frac{\partial U_a}{\partial x} \dot{x}. \quad (4.16')$$

Переход к первоначальному обозначению $u_a = E(U_a)$ осуществляется с помощью тождеств

$$\theta_a(\xi) = \frac{1}{\psi_{\pm}(t)} E^{-1}[u_a(t, x)], \quad (4.17)$$

$$\frac{d\theta_a}{d\xi}(\xi) = \left(\frac{\varphi}{\psi_{\pm}} \right) (t) \frac{k(u_a(t, x))}{u_a(t, x) + 1} \left(\frac{\partial u_a}{\partial x} \right) (t, x) \quad (4.18)$$

(при выводе последнего учитывается, что в силу (4.3) $E'(s) = [E(s) + 1]/k(E(s))$).

Через $\theta(t, \xi)$ обозначим автомодельное представление решения задачи (1)–(3), которое определяется в соответствии с пространственно-временной структурой п. а. р. (4.15) (см. (4.17)):

$$\theta(t, \xi) = \frac{1}{\psi_{\pm}(t)} E^{-1}[u(t, \xi\varphi(t))], \quad \xi \in \mathbb{R}_+^1. \quad (4.19)$$

Будет показано, что при специальном выборе функций $\theta_a(\xi)$ и $\varphi(t)$ автомодельное представление $\theta(t, \xi)$ асимптотически (при $t \rightarrow +\infty$ или $t \rightarrow 1^-$) сходится к $\theta_a(\xi)$, что обеспечивает «близость» решения рассматриваемых задач к п. а. р. (4.15) и тем самым асимптотическую сходимость друг к другу решений уравнений разных порядков — параболического (1) и типа Гамильтона — Якоби. Прежде чем переходить к строгому доказательству основных результатов этого параграфа, поясним, почему на асимптотической стадии происходит такое своеобразное «вырождение» (понижение порядка) исходного параболического уравнения (1). В первую очередь, это связано с условиями (4.1), (4.2). Сделаем в уравнении (1) замену $U = E^{-1}(u)$. Тогда функция U удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial U}{\partial t} = k(E(U)) \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right)^2. \quad (4.20)$$

В результате такой же замены п. а. р. (4.15) уравнения (4.6) примет вид $U_a = E^{-1}(u_a) = \psi_{\pm}(t) \theta_a(\xi)$, причем, как нетрудно видеть, на функции U_a первый оператор в правой части уравнения (4.20) много меньше второго при $t \rightarrow +\infty$ или $t \rightarrow 1^-$. Действительно, в силу (4.2) и (4.5) имеем

$$\left| \frac{k(E(U_a)) \frac{\partial^2 U_a}{\partial x^2}}{\left(\frac{\partial U_a}{\partial x} \right)^2} \right| = \left| \frac{\theta_a''(\xi)}{(\theta_a')^2(\xi)} \right| \frac{k(E(U_a))}{\psi_{\pm}(t)} \lesssim \frac{\omega[\psi_{\pm}(t)]}{\psi_{\pm}(t)} \rightarrow 0,$$

поскольку $\psi_{\pm}(t) \rightarrow +\infty$ при $t \rightarrow +\infty$ или $t \rightarrow 1^-$. Тем самым решение рассматриваемой задачи «близко» к соответствующему п. а. р. уравнения первого порядка

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right)^2, \quad (4.21)$$

которое получается из (4.20) путем отбрасывания первого (асимптотически «малого») члена в правой части. Уравнение (4.21) обратной заменой $v = E(V)$ сводится к виду (4.6).

Из (4.15) следует, что глубина (полуширина) проникновения тепловой волны $x_{\text{эф}}(t)$, удовлетворяющая в каждый момент времени равенству $u(t, x_{\text{эф}}(t)) = (1/2)u(t, 0)$, имеет вид

$$x_{\text{эф}}(t) \simeq \varphi(t) \left\{ \theta_a^{-1} \left[E^{-1} \left(\frac{1}{2} E(\psi_{\pm}(t)) \right) \right] / \psi_{\pm}(t) \right\}. \quad (4.22)$$

Здесь θ_a^{-1} — функция обратная к θ_a (θ_a^{-1} существует на интервале $(0,1)$ в силу монотонности θ_a).

При доказательстве сформулированных ниже теорем мы будем использовать тот факт, что неотрицательное обобщенное решение нелинейных уравнений первого порядка типа (4.21) может быть получено в виде предела при $\varepsilon \rightarrow 0^+$ последовательности классических положительных решений V^ε равномерно параболических уравнений

$$\frac{\partial V^\varepsilon}{\partial t} = \left(\frac{\partial V^\varepsilon}{\partial x} \right)^2 + \varepsilon \frac{\partial^2 V^\varepsilon}{\partial x^2}, \quad (4.21')$$

(см. по этому поводу [2], [3]). Поэтому при выводе необходимых оценок функцию V будем формально считать достаточно гладкой, неявно при этом предполагая, что оценки выводятся сначала применительно к классическому решению V^ε уравнения (4.21'), а конечный результат получается предельным переходом $\varepsilon \rightarrow 0^+$.

1. Приближенные автомодельные решения типа А и Б.

1.1. Граничный режим без обострения. Рассмотрим сначала задачу (1) — (3). В этом случае функция $\theta_a(\xi)$ в п. а. р. (4.15) удовлетворяет задаче (4.10), (4.13), разрешимость которой изучалась в [4]. Преобразование

$$\eta = \ln \xi, \quad \theta_a(\xi) = \xi^2 f_a(\eta) \quad (4.23)$$

приводит (4.10) к виду

$$(f_a')^2 + f_a' \left[4f_a + \frac{1+m}{2} \right] + 4f_a^2 + f_a = 0, \quad \eta \in \mathbf{R}^1.$$

Это уравнение легко интегрируется и (обобщенное) решение задачи (4.10), (4.13) во всех точках, где оно положительно, единственным образом определяется из алгебраического соотношения (см. [4])

$$\left[Y - \frac{1-m}{4} \right]^{\frac{m-1}{4}} \left[Y + \frac{1+m}{4} \right]^{-\frac{m+1}{2}} = m^{\frac{1}{2}} \xi^{-1}, \quad Y = \left[\left(\frac{1+m}{4} \right)^2 + m\theta_a(\xi) \xi^{-2} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (4.24)$$

(в остальных точках полагаем $\theta_a(\xi) = 0$).

Из (4.24), в частности, следует, что функция θ_a финитна:

$$\text{mes sup } \theta_a = 2m^{m/2} (m+1)^{-(m+1)/2} < +\infty.$$

Отметим, что при $m=1$ θ_a имеет вид

$$\theta_a(\xi) = \begin{cases} 1 - \xi, & 0 < \xi < 1, \\ 0, & \xi \geq 1. \end{cases} \quad (4.25)$$

Нам понадобится следующее утверждение, справедливость которого устанавливается непосредственно.

Лемма 4.1. Для решения задачи (4.10), (4.13) справедлива оценка

$$q_m = \sup_{\xi \in \mathbb{R}_+^1} \left| \frac{d^2 \theta_a(\xi)}{d\xi^2} \right| < +\infty. \quad (4.26)$$

Замечание. Нетрудно показать, что при $m > 1$ $\theta_a''(\xi) \geq 0$, а при $0 < m < 1$ $\theta_a''(\xi) \leq 0$ всюду в \mathbb{R}_+^1 . Если $m = 1$, то $\theta_a''(\xi) \equiv 0$ (см. (4.25)).

Теорема 4.1. Пусть выполняются условия (4.1), (4.2) и пусть граничный режим (3) имеет вид $\kappa_+(t) = E(\psi_+(t))$, где функция ψ_+ удовлетворяет условию

$$\left[\frac{\psi_+}{\psi_+'} \right]'(t) \rightarrow \frac{1}{m}, \quad t \rightarrow +\infty; \quad m = \text{const} > 0. \quad (4.27)$$

Тогда

$$\varphi(t) = \left\{ m \frac{\psi_+^2(t)}{\psi_+'(t)} \right\}^{1/2}, \quad t > 0, \quad (4.28)$$

функция $\theta_a(\xi)$ является решением задачи (4.10), (4.13) и справедлива следующая оценка скорости сходимости:

$$\begin{aligned} \|\theta(t, \xi) - \theta_a(\xi)\|_C = O & \left\{ \frac{q_m}{\psi_+(t)} \int_0^t \frac{\omega[\psi_+(\tau)]}{\psi_+(\tau)} \psi_+'(\tau) d\tau + \right. \\ & \left. + \frac{1}{\psi_+(t)} \int_0^t \psi_+(\tau) \left[\left[\ln \frac{\psi_+^{1+m}}{\varphi} \right]'(\tau) \right] d\tau \right\} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned} \quad (4.29)$$

Замечание 1. Из (4.10) следует, что

$$\theta_a = \frac{1}{m} (\theta_a')^2 + \frac{1+m}{2m} \theta_a' \xi.$$

Подставляя это равенство в (4.16) и учитывая при этом условие (4.28), получаем, что функция $U_a = E^{-1}(u_a)$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial U_a}{\partial t} = \left(\frac{\partial U_a}{\partial x} \right)^2 + G_+(t) \frac{\partial U_a}{\partial x} x, \quad (4.30)$$

где $G_+(t) = [\ln(\psi_+^{(1+m)/2m}/\varphi)]'(t)$. Таким образом, в условиях теоремы 4.1 п. а. р. (4.15) удовлетворяет следующему уравнению типа Гамильтона — Якоби:

$$\frac{\partial u_a}{\partial t} = \mathbf{H}(u_a) + G_+(t) \frac{\partial u_a}{\partial x} x. \quad (4.30')$$

Доказательство. Положим $z = U - U_a$, где $U = E^{-1}(u)$, $U_a = E^{-1}(u_a)$. Тогда, как следует из (4.20), (4.30), функция z удовлетворяет уравнению

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial t} = k [E(U)] \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + k [E(U)] \frac{\partial^2 U_a}{\partial x^2} + \\ + \frac{\partial z}{\partial x} \left(\frac{\partial U}{\partial x} + \frac{\partial U_a}{\partial x} \right) - G_+(t) \frac{\partial U_a}{\partial x} x. \end{aligned} \quad (4.31)$$

Из (4.31) в результате применения принципа максимума заключаем, что $\sup_x |z(t, x)| \leq z_0(t)$, где неотрицательная гладкая функция $z_0(t)$.

$z_0(0) = \sup_x |z(0, x)|$, удовлетворяет неравенству

$$\frac{dz_0}{dt} \leq \sup_x k[E(U)] \sup_x \left| \frac{\partial^2 U_a}{\partial x^2} \right| + |G_+(t)| \sup_x \left| \frac{\partial U_a}{\partial x} \right|. \quad (4.32)$$

Используя обозначение (4.4) и конкретный вид функции U_a , получаем

$$\begin{aligned} \sup_x k[E(U)] &= \sup_{s \in [0, \psi_+(t)]} k[E(s)] = \omega[\psi_+(t)], \quad t \rightarrow +\infty, \\ \sup_x \left| \frac{\partial^2 U_a}{\partial x^2} \right| &= \frac{\psi_+(t)}{\varphi^2(t)} q_m = \frac{q_m}{m} \frac{\psi_+'(t)}{\psi_+(t)}, \\ \sup_x \left| \frac{\partial U_a}{\partial x} \right| &= p_m \psi_+(t), \quad p_m = \sup_{\xi \in \mathbb{R}_+^1} \left| \frac{d\theta_a}{d\xi} \xi \right| < +\infty. \end{aligned}$$

Подставляя эти равенства в (4.32), выводим при достаточно больших t оценку

$$\frac{dz_0}{dt} \leq \frac{q_m}{m} \frac{\omega[\psi_+(t)]}{\psi_+(t)} \psi_+'(t) + p_m G_+(t) \psi_+(t).$$

Отсюда, поскольку

$$\|\theta(t, \xi) - \theta_a(\xi)\|_C \leq \frac{z_0(t)}{\psi_+(t)},$$

прямо следует оценка (4.29).

Остается убедиться в сходимости $\theta \rightarrow \theta_a$ при $t \rightarrow +\infty$. Раскрывая неопределенность в правой части (4.29), с учетом (4.5), (4.28), (4.27) имеем

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} \|\theta(t, \xi) - \theta_a(\xi)\|_C &\leq \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\omega[\psi_+(t)]}{\psi_+(t)} \frac{q_m}{m} + \\ &+ \left\{ \frac{1}{2m} - \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\frac{\psi_+}{\psi_+'} \right]'(t) \right\} = 0. \end{aligned}$$

Теорема доказана.

Замечание 2. В частном случае $\psi_+(t) = (1+t)^m$, когда $\varphi(t) = (1+t)^{(1+m)/2}$ и п. а. р. (4.15) совпадает с функцией (4.7) — точным инвариантным решением уравнения (4.6), теорема 4.1 доказана в [4]. Оценка сходимости в этом случае упрощается — отсутствует второй член в правой части (4.29).

Замечание 3. При $m=1$ функция θ_a имеет вид (4.25), $\theta_a'' \equiv 0$ и поэтому оценка сходимости (4.29) существенно улучшается — в ней отсутствует первый («нелинейный») член. Это связано с тем, что в этом случае инвариантное решение (4.7) уравнения (4.6), на основе которого строятся п. а. р. (4.15), является инвариантным решением исходного уравнения (1) и имеет вид

$$v_A(t, x) = \begin{cases} E[1+t-x], & 0 < x < 1+t, \\ 0, & x \geq 1+t. \end{cases} \quad (4.33)$$

Решение подобного типа часто называют «бегущей волной».

Исходя из сделанного замечания, можно считать, что п. а. р. (4.15), построенные в этом параграфе, лежат в «окрестности» инвариантного решения (4.33) уравнения (1). Понятие «окрестность» в этом случае следует понимать весьма широко: пространственно-временные структу-

ры п. а. р. (4.15) (или, в частности, п. а. р. (4.7)—(4.9)) и функции (4.33) имеют мало общего.

Возможности теоремы 4.1 продемонстрируем на одном примере.

Пример 6. Рассмотрим задачу (1)—(3) для уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\ln(1+u) \frac{\partial u}{\partial x} \right]. \quad (4.34)$$

Коэффициент k в (4.34) удовлетворяет условиям (4.1), (4.2) (см. таблицу 8). Преобразование E имеет вид $E(s) \cong \exp[(2s)^{1/2}]$. Пусть $\psi_+(t) = (1+t)^m / \ln(2+t)$ (условие (4.27) при этом выполнено), т. е.

$$\kappa_+(t) \cong \exp\{[2(1+t)^m / \ln(2+t)]^{1/2}\}, \quad t > 0.$$

Поэтому в силу теоремы 4.1 функция $\varphi(t)$ в п. а. р. (4.15) оценивается при больших t по формуле

$$\varphi(t) \cong t^{(1+m)/2} \ln^{-1/2} t \quad (4.35)$$

(с такой скоростью, например, движется при $t \rightarrow +\infty$ точка «фронта» тепловой волны). Глубина (полуширина) проникновения тепловой волны, как следует из (4.22), в рассматриваемом случае имеет вид

$$x_{\text{эф}}(t) \cong \left(\frac{2}{m}\right)^{1/2} \ln 2 \cdot t^{1/2}, \quad t \rightarrow +\infty. \quad (4.36)$$

При выводе этого соотношения мы учли, что для малых ξ $\theta_a(\xi) \cong 1 - m^{1/2} \xi$, т. е. $\theta_a^{-1}(\xi) \cong (1 - \xi) m^{-1/2}$.

Отметим, что здесь пространственная структура тепловой волны сильно меняется со временем: скорости движения двух его выделенных точек — точки «фронта» (4.35) и полуширины (4.36) — все больше и больше отличаются друг от друга по мере того, как $t \rightarrow +\infty$ (эта особенность присуща решениям всех рассматриваемых здесь задач).

1.2. Граничный режим с обострением. Рассмотрим теперь задачу (1)—(3') с заданным при $x=0$ режимом с обострением. Функция θ_a в (4.15) удовлетворяет здесь задаче (4.11), (4.15). Уравнение (4.11) анализируется с помощью преобразования (4.25) и θ_a во всех точках, где она положительна, удовлетворяет равенствам (см. [4]—[7])

$$\left[X - \frac{1+n}{4} \right]^{\frac{1+n}{2}} \left[X + \frac{1-n}{5} \right]^{\frac{1-n}{2}} = (-n)^{\frac{1}{2}} \xi^{-1}, \quad (4.37)$$

$$X = \left[\left(\frac{1+n}{4} \right)^2 - n \theta_a(\xi) \xi^{-2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

(в остальных точках полагаем $\theta_a(\xi) = 0$).

Укажем некоторые свойства функции θ_a . При $n < -1$ она финитна: $\text{mes sup } \theta_a = 2(-n)^{n/2} (-1-n)^{-(1+n)/2} < +\infty$. При $n \in (-1, 0)$ $\theta_a(\xi) > 0$ всюду в \mathbf{R}_+^1 , причем

$$\theta_a(\xi) \simeq C(n) \xi^{\frac{2n}{1+n}}, \quad \xi \rightarrow +\infty, \quad (4.38)$$

где $C(n) = -[(1+n)/2n] 2^{-2n/(1+n)} (-n)^{1/(1+n)}$. При $n = -1$

$$\theta_a(\xi) = \begin{cases} (1 - \xi/2)^2, & 0 < \xi < 2, \\ 0, & \xi \geq 2. \end{cases} \quad (4.39)$$

Лемма 4.2. Для решения задачи (4.11), (4.13) справедлива оценка

$$q_n = \sup_{\xi \in \mathbb{R}_+^1} \left| \frac{d^2 \theta_a}{d\xi^2}(\xi) \right| < +\infty. \quad (4.40)$$

Теорема 4.2. Пусть выполняются условия (4.1), (4.2) и пусть граничный режим (3') имеет вид $\kappa_-(t) = E(\psi_-(t))$, где функция ψ_- удовлетворяет условию

$$\left[\frac{\psi_-}{\psi_-'} \right]'(t) \rightarrow \frac{1}{n}, \quad t \rightarrow 1^-; \quad n = \text{const} < 0. \quad (4.41)$$

Тогда

$$\varphi(t) = \left\{ (-n) \frac{\psi_-^2(t)}{\psi_-'(t)} \right\}^{1/2}, \quad t \in (0, 1), \quad (4.42)$$

функция $\theta_a(\xi)$ является решением задачи (4.11), (4.13) и справедлива следующая оценка скорости сходимости:

$$\begin{aligned} \|\theta(t, \xi) - \theta_a(\xi)\|_C = O & \left\{ \frac{q_n}{\psi_-(t)} \int_0^t \frac{\omega[\psi_-(\tau)]}{\psi_-(\tau)} \psi_-'(\tau) d\tau + \right. \\ & \left. + \frac{1}{\psi_-(t)} \int_0^t \psi_-(\tau) \left[\left[\ln \frac{\psi_-^{1+n}}{\varphi} \right]'(\tau) \right] d\tau \right\} \xrightarrow{t \rightarrow 1^-} 0. \end{aligned} \quad (4.43)$$

Замечание 1. В условиях теоремы 4.2 п. а. р. (4.15) удовлетворяет уравнению первого порядка

$$\frac{\partial u_a}{\partial t} = \frac{k(u_a)}{u_a + 1} \left(\frac{\partial u_a}{\partial x} \right)^2 + G_-(t) \frac{\partial u_a}{\partial x} x, \quad (4.44)$$

где $G_-(t) = \left[\ln \left(\psi_-^{1+n} / \varphi \right) \right]'(t)$.

Замечание 2. Для частного случая $\psi_-(t) = (1-t)^n$, когда $\varphi(t) = (1-t)^{(1+n)/2}$ (см. (4.42)) и п. а. р. (4.15) совпадает с функцией (4.8), теорема 4.2 доказана в [4]. При $k(u) \equiv 1$, когда $\kappa_-(t) = E(\psi_-(t)) \cong \exp[(1-t)^n]$, справедливость утверждения, аналогичного теореме 4.2, ранее установлена в работах [5]—[7], где исследовался эффект локализации тепла в средах с постоянными свойствами. Отметим, что во всех перечисленных случаях правая часть оценки сходимости (4.43) выглядит много проще — в ней отсутствует второй член.

Теорема 4.2 доказывается точно так же, как предыдущая.

Пример 7. Рассмотрим задачу (1)—(3') для уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \ln[1 + \ln(1 + u)] \frac{\partial u}{\partial x} \right\}. \quad (4.45)$$

Условия (4.1), (4.2) при этом выполнены (см. таблицу 8). Пусть $\psi_-(t) = (1-t)^\alpha \ln^\alpha [1 + (1-t)^{-1}]$, где α — некоторая постоянная, т. е. граничный режим (3') имеет вид (см. функцию E в таблице 8).

$$\kappa_-(t) = E[\psi_-(t)] \cong \exp \left\{ \frac{(1-t)^n}{(-n)} \ln^{\alpha-1} [(1-t)^{-1}] \right\} \quad (4.46)$$

при $t \rightarrow 1^-$. Поэтому в силу теоремы 4.2 функция $\varphi(t)$ (скорость движения «фронта» тепловой волны, порожденной режимом (4.46)) оценива-

ется по формуле

$$\varphi(t) \cong (1-t)^{\frac{1+n}{2}} \ln^{\frac{\alpha}{2}} [(1-t)^{-1}], \quad t \rightarrow 1^-.$$

Отсюда заключаем, что при $n < -1$ волна прогревает до бесконечности все пространство (HS -режим), при $n \in (-1, 0)$ $u(t, x) \rightarrow +\infty$ при $t \rightarrow 1^-$ только в точке $x=0$ (LS -режим). При $n = -1$ и $\alpha = 0$

$$\kappa_-(t) \cong \exp \left\{ \frac{(1-t)^{-1}}{\ln [(1-t)^{-1}]} \right\}, \quad t \rightarrow 1^-,$$

и реализуется S -режим, когда «фронт» тепловой волны неподвижен и решение возрастает до бесконечности при $t \rightarrow 1^-$ на ограниченном множестве $0 \leq x < 2 = \text{mes sup} \theta_a(\xi)$. Отметим, что при всех $n < 0$ глубина проникновения волны $x_{\text{эф}}(t)$ сокращается: $x_{\text{эф}}(t) \rightarrow 0, t \rightarrow 1^-$.

2. Приближенные автомодельные решения типа В.

2.1. Граничный режим без обострения. Рассмотрим задачу (1)–(3). Функция θ_a в п. а. р. (4.15) удовлетворяет задаче (4.12), (4.13) и при всех ξ таких, что $\theta_a(\xi) > 0$, определяется из равенств (см. [8])

$$Z + \exp \left[\frac{1}{4Z} \right] = \xi^{-1}, \quad Z = \frac{1}{4} + \left[\frac{1}{16} + \theta_a(\xi) \xi^{-2} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (4.47)$$

(в остальных точках полагаем $\theta_a(\xi) = 0$). Из (4.47) следует, что функция $\theta_a(\xi)$ финитна, причем $\text{mes sup} \theta_a = (1/2 + \exp(1/2))^{-1}$. Кроме того, справедлива следующая

Лемма 4.3. Для решения задачи (4.12), (4.13) выполняется оценка

$$q_\infty = \sup_{\xi \in \mathbb{R}_+^1} \left| \frac{d^2 \theta_a}{d\xi^2}(\xi) \right| < +\infty. \quad (4.48)$$

Теперь можно сформулировать утверждение, которое доказывается точно так же, как теорема 4.1.

Теорема 4.3. Пусть выполняются условия (4.1), (4.2) и пусть граничный режим (3) имеет вид $\kappa_+(t) = E[\psi_+(t)]$, где функция ψ_+ удовлетворяет условию

$$\left[\frac{\psi_+}{\psi_+'} \right]'(t) \rightarrow 0, \quad t \rightarrow +\infty. \quad (4.49)$$

Тогда

$$\varphi(t) = \left\{ \frac{\psi_+^2(t)}{\psi_+'(t)} \right\}^{\frac{1}{2}}, \quad t > 0, \quad (4.50)$$

функция $\theta_a(\xi)$ является решением задачи (4.12), (4.13) и справедлива следующая оценка скорости сходимости:

$$\begin{aligned} \|\theta(t, \xi) - \theta_a(\xi)\|_C &= O \left\{ \frac{q_\infty}{\psi_+(t)} \int_0^t \frac{\omega[\psi_+(\tau)]}{\psi_+(\tau)} \psi_+'(\tau) d\tau + \right. \\ &\left. + \frac{1}{\psi_+(t)} \int_0^t \psi_+(\tau) \left| \left[\ln \frac{\psi_+^{1/2}}{\varphi} \right]'(\tau) \right| d\tau \right\} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned} \quad (4.51)$$

Замечание 1. Из (4.12), (4.16), (4.50) следует, что в условиях теоремы 4.3 п. а. р. (4.15) удовлетворяет уравнению (4.30'), где $G_+(t) = [\ln(\psi_+^{1/2}/\varphi)]'(t)$.

З а м е ч а н и е 2. В одном частном случае $k(u) \equiv 1$, $\psi_+(t) = \exp(t)$, когда $\varphi(t) = \exp(t/2)$, $E(s) \simeq \exp(s)$ и $\kappa_+(t) \simeq \exp[\exp(t)]$, теорема 4.3 сформулирована в [8]. В этом случае оценка (4.51), как нетрудно проверить, имеет вид

$$\|\theta(t, \xi) - \theta_a(\xi)\|_C = O\{t \exp(-t)\} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0.$$

П р и м е р 8. Рассмотрим задачу (1)–(3) для уравнения (4.45). Пусть $\psi_+(t) = \exp[(1+t)^2 \ln(1+t)]$ (условие (4.49) выполняется), т. е. граничный режим имеет вид

$$\kappa_+(t) = E[\psi_+(t)] \cong \exp\{\exp[t^2 \ln t]/t^2 \ln t\}$$

при больших t . Поэтому в силу теоремы 4.3 функция $\varphi(t)$ (координата «фронта» тепловой волны) оценивается при $t \rightarrow +\infty$ по формуле

$$\varphi(t) = \left\{ \frac{\psi_+^2(t)}{\psi_+'(t)} \right\}^{1/2} \cong [2t \ln t]^{-1/2} \exp\left[\frac{t^2}{2} \ln t\right]. \quad (4.52)$$

Глубина проникновения волны, как следует из (4.22), в данном случае имеет вид

$$x_{\text{эф}}(t) \cong \frac{\ln 2}{2^{1/2}} t^{3/2} \ln^{1/2} t \exp\left[-\frac{t^2}{2} \ln t\right], \quad t \rightarrow +\infty.$$

Заметим, что в отличие от точки «фронта» (4.52), которая «уходит» как угодно далеко при $t \rightarrow +\infty$, полуширина волны на асимптотической стадии сокращается вплоть до нуля.

2.2. Граничный режим с обострением. Ниже строятся п. а. р. типа В задачи (1)–(3'). Сформулированная теорема доказывается так же, как предыдущие.

Т е о р е м а 4.4. Пусть выполняются условия (4.1), (4.2) и пусть граничный режим (3') имеет вид $\kappa_-(t) = E[\psi_-(t)]$, где функция ψ_- удовлетворяет условию

$$\left[\frac{\psi_-}{\psi_-' } \right]'(t) \rightarrow 0, \quad t \rightarrow 1^- \quad (4.53)$$

Тогда

$$\varphi(t) = \left\{ \frac{\psi_-^2(t)}{\psi_-'(t)} \right\}^{1/2}, \quad t \in (0, 1), \quad (4.54)$$

функция $\theta_a(\xi)$ является решением задачи (4.12), (4.13) и справедлива следующая оценка скорости сходимости:

$$\begin{aligned} \|\theta(t, \xi) - \theta_a(\xi)\|_C = O \left\{ \frac{q_\infty}{\psi_-(t)} \int_0^t \frac{\omega[\psi_-(\tau)]}{\psi_-(\tau)} \psi_-'(\tau) d\tau + \right. \\ \left. + \frac{1}{\psi_-(\tau)} \int_0^t \psi_-(\tau) \left| \left[\ln \frac{\psi_-^{1/2}}{\varphi} \right]'(\tau) \right| d\tau \right\} \xrightarrow{t \rightarrow 1^-} 0. \end{aligned} \quad (4.55)$$

З а м е ч а н и е. В условиях теоремы п. а. р. (4.15) удовлетворяет уравнению (4.44), в котором $G_-(t) = [\ln(\psi_-^{1/2}/\varphi)]'(t)$.

П р и м е р 9. Пусть в задаче (1)–(3') для уравнения (4.34) граничный режим (3') имеет вид

$$\kappa_-(t) = \exp\{[2 \exp[(1-t)^{-2}]]^{1/2}\}, \quad t \in (0, 1),$$

т. е. $\psi_-(t) \cong \exp[(1-t)^{-2}]$ при $t \rightarrow 1^-$. Условие (4.53) этой функцией удовлетворяется и тогда из теоремы 4.4 получаем для $\varphi(t)$ (координаты «фронта») оценку

$$\varphi(t) \cong (1-t)^{3/2} \exp[(1-t)^{-2}/2] \rightarrow +\infty, \quad t \rightarrow 1^-.$$

В то же время глубина проникновения тепловой волны имеет вид

$$x_{\text{эф}}(t) \cong 2^{1/2} \ln 2 (1-t)^{3/2} \rightarrow 0, \quad t \rightarrow 1^-.$$

При выводе этой оценки из (4.22) учитывалось, что $\theta_a(\xi) \cong 1 - \xi$ при малых ξ , т. е. $\theta_a^{-1}(\xi) \cong 1 - \xi$ при $\xi \rightarrow 1^-$.

3. Отметим, что построенная в этом параграфе система п. а. р. уравнений (1) с коэффициентами k , удовлетворяющими условиям (4.1), (4.2), является не совсем полной — исследование не охватывает граничные режимы $\kappa_{\pm}(t) = E[\psi_{\pm}(t)]$, где функция ψ_{\pm} такова, что

$$\left[\frac{\varphi_{\pm}}{\psi'_{\pm}} \right]'(t) \rightarrow \infty \quad (4.56)$$

при $t \rightarrow +\infty$ или $t \rightarrow 1^-$. Надо сказать, что уравнение (4.6) имеет точное инвариантное решение $v_A(t, x)$, на основе которого можно формально определить такие п. а. р. Это решение имеет вид

$$\Gamma. v_A(t, x) = E \left[\theta_a \left(\frac{x}{(1+t)^{1/2}} \right) \right], \quad (t, x) \in \mathbf{R}_+^1 \times \mathbf{R}_+^1, \quad (4.57)$$

где функция θ_a удовлетворяет обыкновенному дифференциальному уравнению

$$(\theta'_a)^2 + \frac{1}{2} \theta'_a \xi = 0, \quad \xi \in \mathbf{R}_+^1, \quad (4.58)$$

которое получается подстановкой выражения (4.57) в (4.6), и краевым условиям (4.13). Решением задачи (4.58), (4.13) является функция

$$\theta_a(\xi) = \begin{cases} 1 - \xi^2/4, & 0 < \xi < 2, \\ 0, & \xi \geq 2. \end{cases} \quad (4.59)$$

Есть основания ожидать, что при выполнении условия (4.56) задача (1) — (3) имеет п. а. р., которые следует искать в виде (4.15), где $\theta_a(\xi)$ — функция (4.59). Поскольку в силу (4.58) $\theta'_a \xi = 2(\theta'_a)^2$, функция $U_a = E^{-1}(u_a)$ будет удовлетворять уравнению (см. (4.16))

$$\frac{\partial U_a}{\partial t} = \left(\frac{2\varphi\varphi'}{\psi_+} \right)(t) \left(\frac{\partial U_a}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\psi'_+}{\psi_+} \right)(t) U_a. \quad (4.60)$$

Отсюда видно, что необходимо положить

$$\varphi(t) = \left\{ \int_0^t \varphi_+(\tau) d\tau \right\}^{1/2}, \quad t > 0.$$

Тогда уравнение (4.60) примет вид

$$\frac{\partial U_a}{\partial t} = \left(\frac{\partial U_a}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\psi'_+}{\psi_+} \right)(t) U_a \quad (4.61)$$

и его можно сопоставить с уравнением (4.20). Однако в этом случае из уравнения для разности $z = U - U_a$ нельзя получить оценку, обеспечивающую сходимость $\theta(t, \xi) \rightarrow \theta_a(\xi)$ при $t \rightarrow +\infty$ в норме $C(\mathbf{R}_+^1)$. Действи-

тельно, второй член в правой части (4.61) обеспечивает наличие оценки

$$\sup_x |U(t, x) - U_a(t, x)| = O(\psi_+(t)), \quad t \rightarrow +\infty.$$

Поэтому $\|\theta - \theta_a\|_C = O(\psi_+(t)/\psi_+(t)) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$.

Напомним, что в § 2 работы [1] подобную трудность удалось обойти путем вывода оценки скорости сходимости в норме $H^{-1}(\mathbf{R}_+^1)$, а не $C(\mathbf{R}_+^1)$ (см. теорему 2.1 в [1]).

Для задачи (1) — (3') с граничным режимом с обострением п. а. р. типа Γ вообще не существует⁹. Действительно, функция θ_a в (4.15) должна здесь удовлетворять уравнению

$$(\theta'_a)^2 - \frac{1}{2} \theta'_a \xi = 0, \quad \xi \in \mathbf{R}_+^1,$$

которое ограниченных решений, удовлетворяющих условию $\theta_a(+\infty) = 0$, не имеет.

В заключение еще раз подчеркнем, что построенные в этом параграфе приближенные автомодельные решения не имеют себе аналогов в классе всех точных инвариантных решений уравнения (1) (см. [9]).

§ 5. Приближенные автомодельные решения линейного уравнения теплопроводности

В этом параграфе рассматриваются п. а. р. краевой задачи для линейного параболического уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (5.1)$$

$$u(t, 0) = \kappa(t) > 0, \quad t \geq 0; \quad \kappa \in C^2(\mathbf{R}_+^1). \quad (5.2)$$

Для простоты полагаем $u(x, 0) \equiv 0$; тогда $u(t, +\infty) = 0$ при всех $t > 0$. Не ограничивая общности исследования проведем для монотонных граничных режимов $\kappa(t)$, определенных для любых $t > 0$ и таких, что $\kappa(t) \rightarrow +\infty$, $t \rightarrow +\infty$. П. а. р., отвечающие граничным режимам с обострением, строятся аналогичным образом (см. все предыдущие параграфы, в которых отчетливо проявляется эта аналогия).

Решение рассматриваемой задачи допускает интегральное представление в виде теплового потенциала двойного слоя (см. [15])

$$u(t, x) = \frac{x}{2\pi^{1/2}} \int_0^t \exp\left[-\frac{x^2}{4(t-\tau)}\right] (t-\tau)^{3/2} \kappa(\tau) d\tau,$$

который, однако, имеет достаточно сложный вид, и поэтому в общем случае (при произвольных граничных функциях κ) непосредственное выделение из него асимптотических свойств решения весьма затруднительно.

При построении полной системы п. а. р. нам понадобятся следующие три типа автомодельных решений уравнения (5.1):

- I. $u_A(t, x) = f_1(\xi), \quad \xi = x/t^{1/2}$,
- II. $u_A(t, x) = t^m f_2(\xi), \quad \xi = x/t^{1/2} \quad (m > 0)$,
- III. $u_A(t, x) = \exp(t) f_3(\xi), \quad \xi = x$.

⁹ В этом случае существуют п. а. р. задачи с дополнительным краевым условием на подвижной правой границе.

Подставляя функции u_A в (5.1), получаем для f_1 , f_2 и f_3 уравнения

$$f_1'' + \frac{1}{2} f_1' \zeta = 0, \quad \zeta \in \mathbf{R}_+^1, \quad (5.3)$$

$$f_2'' + \frac{1}{2} f_2' \zeta - m f_2 = 0, \quad \zeta \in \mathbf{R}_+^1, \quad (5.4)$$

$$f_3'' - f_3 = 0, \quad \zeta \in \mathbf{R}_+^1. \quad (5.5)$$

Кроме того, потребуем выполнения краевых условий

$$f_i(0) = 1, \quad f_i(+\infty) = 0; \quad i = 1, 2, 3. \quad (5.6)$$

Уравнения (5.3)—(5.5) легко интегрируются, и тогда с учетом (5.6) получаем

$$f_1(\zeta) = \pi^{-1/2} \int_{\zeta}^{+\infty} \exp(-s^2/4) ds, \quad (5.7)$$

$$\begin{aligned} f_2(\zeta) &= \pi^{-1/2} 2^{2m+1} \Gamma(1+m) \exp\left(-\frac{\zeta^2}{4}\right) H_{-2m-1}\left(\frac{\zeta}{2}\right) = \\ &= \pi^{-1/2} 2^{2m+1} \frac{\Gamma(1+m)}{\Gamma(1+2m)} \exp\left(-\frac{\zeta^2}{4}\right) \int_0^{\infty} \exp(-s^2 - \zeta s) s^{2m} ds \end{aligned} \quad (5.8)$$

(здесь H_{-2m-1} — обозначение функции Эрмита [16]),

$$f_3(\zeta) = \exp(-\zeta). \quad (5.9)$$

Отметим, что решениями типа I—III и $u_A(t, x) = \ln t + f_i(x/t^{1/2})$, которое не удовлетворяет условию $u_A(t, +\infty) = 0$, исчерпывается весь набор существенно отличающихся друг от друга инвариантных решений уравнения (5.1) (см. [17]).

1. Так же, как в § 2 (см. [1]), п. а. р. задачи (5.1), (5.2) будем искать в виде

$$u_a(t, x) = \kappa(t) \theta_a(\zeta), \quad \zeta = \frac{x}{\Phi(t)}, \quad (5.10)$$

где неизвестные функции $\theta_a(\zeta)$ и $\Phi(t)$, $\theta_a(0) = 1$, $\theta_a(+\infty) = 0$, определим из условия сходимости при $t \rightarrow +\infty$ функции θ_a к автомодельному представлению $\theta(t, \zeta)$ решения задачи. Оно имеет вид

$$\theta(t, \zeta) = \frac{1}{\kappa(t)} u(t, \zeta \Phi(t)), \quad \zeta \in \mathbf{R}_+^1. \quad (5.11)$$

Из (5.10) следует, что при условии $\theta \rightarrow \theta_a$, $t \rightarrow +\infty$, глубина проникновения тепловой волны при достаточно больших t может быть оценена по формуле

$$x_{\text{эф}}(t) \cong \bar{\zeta} \Phi(t), \quad (5.12)$$

где $\bar{\zeta}$ — корень уравнения $\theta_a(\bar{\zeta}) = 1/2$.

Нетрудно убедиться, что п. а. р. (5.10) удовлетворяют уравнению

$$\frac{\partial u_a}{\partial t} = \kappa'(t) \theta_a(\zeta) - \kappa(t) \frac{\Phi'(t)}{\Phi(t)} \frac{d\theta_a(\zeta)}{d\zeta} \zeta \quad (5.13)$$

или, что тоже самое, уравнению

$$\frac{\partial u_a}{\partial t} = \left(\frac{\kappa'}{\kappa}\right)(t) u_a - \left(\frac{\Phi'}{\Phi}\right)(t) \frac{\partial u_a}{\partial x} x. \quad (5.13')$$

В зависимости от вида функции θ_a в (5.10) построение п. а. р. разбивается на три случая. Отметим, что другой класс «вырожденных» п. а. р. уравнения (5.1) рассмотрен в § 4. В заключительном пункте параграфа эти п. а. р. будут сопоставлены с п. а. р. (5.10).

1.1. Приближенные автомодельные решения типа I.
Теорема 5.1. Пусть выполняется условие

$$\left[\frac{\kappa}{\kappa'} \right]' (t) \rightarrow +\infty, \quad t \rightarrow +\infty. \quad (5.14)$$

Тогда $\Phi(t) = t^{1/2}$, $\theta_a(\xi) = f_1(\xi)$, где f_1 имеет вид (5.7), и справедлива следующая оценка скорости сходимости:

$$\|\theta(t, \xi) - \theta_a(\xi)\|_2 = O \left\{ \frac{1}{\kappa(t) t^{1/4}} \int_1^t \tau^{1/4} \kappa'(\tau) d\tau \right\} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0. \quad (5.15)$$

Замечание 1. Из (5.3) следует, что $f_1' \xi = -2f_1''$. Подставляя это равенство (5.13), получаем, что в условиях теоремы п. а. р. (5.10) удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial u_a}{\partial t} = \mathbf{B}(t, u_a) = \frac{\partial^2 u_a}{\partial x^2} + \left(\frac{\kappa'}{\kappa} \right) (t) u_a, \quad (5.16)$$

которое отличается от исходного дополнительным членом в правой части.

Доказательство. Положим $w(t, x) = u(t, x) - u_a(t, x)$ всюду в $\mathbf{R}_+^1 \times \mathbf{R}_+^1$. Тогда $w(t, 0) = w(t, +\infty) = 0$ и, кроме того, $w(t, \cdot) \in L^2(\mathbf{R}_+^1)$ при всех $t > 0$. Из (5.1), (5.16) следует, что функция w удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} - \left(\frac{\kappa'}{\kappa} \right) (t) u_a. \quad (5.17)$$

Умножая скалярно обе части уравнения на w и учитывая при этом, что

$$\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, w \right) = - \left\| \frac{\partial w}{\partial x} \right\|_2^2 \leq 0,$$

придем к неравенству

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|w\|_2^2 \leq - \left(\frac{\kappa'}{\kappa} \right) (t) (u_a, w).$$

Отсюда с помощью неравенства Коши — Буняковского $(u_a, w) \leq \|u_a\|_2 \|w\|_2$ получаем

$$\frac{d}{dt} \|w\|_2 \leq \left(\frac{\kappa'}{\kappa} \right) (t) \|u_a\|_2. \quad (5.18)$$

Учитывая теперь, что в силу (5.10), (5.11)

$$\|u_a\|_2 = \kappa(t) t^{-1/4} \|f_1(\xi)\|_2 \quad (\|f_1(\xi)\|_2 < +\infty),$$

$$\|w\|_2 = \kappa(t) t^{-1/4} \|\theta(t, \xi) - \theta_a(\xi)\|_2,$$

из (5.18) заключаем, что при $t > 1$

$$\begin{aligned} \|\theta(t, \xi) - \theta_a(\xi)\|_2 &\leq [\|w(1, x)\|_2 / \kappa(t) t^{1/4}] + \\ &+ \|f_1(\xi)\|_2 \int_1^t \tau^{1/4} \kappa'(\tau) d\tau / \kappa(t) t^{1/4}. \end{aligned}$$

Отсюда непосредственно следует справедливость оценки (5.15).

Далее, раскрывая неопределенность в правой части (5.15), имеем

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{\kappa(t) t^{1/4}} \int_1^t \tau^{1/4} \kappa'(\tau) d\tau &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{1}{4} \frac{\kappa(t)}{\kappa'(t) t} \right]^{-1} = \\ &= \left[1 + \frac{1}{4} \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{\kappa}{\kappa'} \right)'(t) \right]^{-1} = 0 \end{aligned}$$

(на последнем этапе использовано условие (5.14)). Поэтому $\theta \rightarrow \theta_a$ при $t \rightarrow +\infty$. Теорема доказана.

Замечание 2. Из (5.16) следует, что $u_a(t, x)$ является верхним решением уравнения (5.1) (поскольку $\kappa'(t) \geq 0$), так что при выполнении условия (5.14) всюду в $\mathbf{R}_+^1 \times \mathbf{R}_+^1$ справедлива оценка

$$u(t, x) \leq u_a(t, x) = \kappa(t) f_1(x/t^{1/2}).$$

Эта оценка является (в определенном смысле) неулучшаемой.

Конкретные случаи применения теоремы 5.1 указаны в таблице 9 в конце этого параграфа.

1.2. Приближенные автомодельные решения типа II.
Теорема 5.2. Пусть выполняется условие (ср. (5.15))

$$\left[\frac{\kappa}{\kappa'} \right]'(t) \rightarrow \frac{1}{m}, \quad t \rightarrow +\infty; \quad m = \text{const} > 0. \quad (5.19)$$

Тогда $\Phi(t) = t^{1/2}$, $\theta_a(\xi) = f_2(\xi)$, где f_2 вычисляется по формуле (5.8), и справедлива следующая оценка скорости сходимости:

$$\|\theta(t, \xi) - \theta_a(\xi)\|_C = O \left\{ \frac{1}{\kappa(t)} \int_1^t \left| \kappa'(\tau) - \frac{m}{\tau} \kappa(\tau) \right| d\tau \right\} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0. \quad (5.20)$$

Замечание 1. Из (5.4) следует, что $f_2 \xi = -2f_2'' + 2mf_2$. Подставив это равенство в (5.13), получим, что в условиях теоремы п. а. р. (5.10) удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial u_a}{\partial t} = \mathbf{B}(t, u_a) = \frac{\partial^2 u_a}{\partial x^2} + \left[\left(\frac{\kappa}{\kappa'} \right)'(t) - \frac{m}{t} \right] u_a, \quad (5.21)$$

которое отличается от исходного.

Доказательство. Положим $w(t, x) = u(t, x) - u_a(t, x)$. Тогда, как следует из (5.1), (5.21), функция w удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} - \left[\left(\frac{\kappa'}{\kappa} \right)'(t) - \frac{m}{t} \right] u_a, \quad (5.22)$$

причем $w(t, 0) = w(t, +\infty) = 0$ при всех $t > 0$. Из (5.22) в силу принципа максимума получаем, что $\sup_x |w(t, x)| \leq \omega_0(t)$, где неотрицательная ограниченная функция $\omega_0(t)$ удовлетворяет оценке

$$\frac{d\omega_0}{ds}(t) \leq \left| \kappa'(t) - \frac{m}{t} \kappa(t) \right|, \quad t > 0,$$

при выводе которой также учитывается, что $u_a(t, x) \leq \psi(t)$. Поскольку $\|\theta(t, \xi) - \theta_a(\xi)\|_C \leq \omega_0(t)/\kappa(t)$, отсюда непосредственно следует, что при $t > 1$

$$\|\theta(t, \xi) - \theta_a(\xi)\|_C \leq \omega_0(1)/\kappa(t) + \int_1^t \left| \kappa'(\tau) - \frac{m}{\tau} \kappa(\tau) \right| d\tau / \kappa(t).$$

Раскрыв теперь неопределенность в правой части (5.20), с учетом (5.19) получим

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} \|\theta - \theta_a\|_C &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left| 1 - m \frac{\kappa(t)}{\kappa'(t)t} \right| = \\ &= \left| 1 - m \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{\kappa}{\kappa'} \right)'(t) \right| = \left| 1 - m \frac{1}{m} \right| = 0. \end{aligned}$$

Теорема доказана.

З а м е ч а н и е 2. Нетрудно убедиться, что в условиях теоремы 5.1 из уравнения (5.17) оценку скорости сходимости в норме $C(\mathbf{R}_+^1)$ вывести нельзя.

З а м е ч а н и е 3. В условиях теоремы 5.2

$$\|\theta(t, \xi) - f_2(\xi)\|_2 = O \left\{ \frac{1}{\kappa(t)t^{1/4}} \int_1^t \tau^{-3/4} \kappa(\tau) \left| \frac{\kappa'(\tau)\tau}{\kappa(\tau)} - m \right| d\tau \right\} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0,$$

т. е. $\theta \rightarrow f_2$ при $t \rightarrow +\infty$ в норме $L^2(\mathbf{R}_+^1)$.

З а м е ч а н и е 4. Из (5.21) следует, что при $\kappa'/\kappa \geq m/t$ п. а. р. (5.10) является верхним, а при $\kappa'/\kappa \leq m/t$ — нижним решением уравнения (5.1).

Некоторые конкретные применения теоремы 5.2 приведены в таблице 9.

1.3. Приближенные автомодельные решения типа III.

Теорема 5.3. Пусть выполняется условие (ср. (5.14), (5.19))

$$\left[\frac{\kappa}{\kappa'} \right]'(t) \rightarrow 0, \quad t \rightarrow +\infty. \quad (5.23)$$

Тогда

$$\Phi(t) = [\kappa(t)/\kappa'(t)]^{1/2}, \quad t > 0, \quad (5.24)$$

$\theta_a(\xi) = f_3(\xi)$, где функция f_3 вычисляется по формуле (5.9), и справедлива следующая оценка скорости сходимости:

$$\|\theta(t, \xi) - \theta_a(\xi)\|_C = O \left\{ \frac{1}{\kappa(t)} \int_1^t \kappa'(\tau) \left| \left(\frac{\kappa}{\kappa'} \right)'(\tau) \right| d\tau \right\} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0. \quad (5.25)$$

З а м е ч а н и е 1. Из (5.5) следует, что $f_3 = f_3''$. Подставив это равенство в (5.13), получим в силу (5.24), что в условиях теоремы п. а. р. (5.10) удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial u_a}{\partial t} = \mathbf{B}(t, u_a) = \frac{\partial^2 u_a}{\partial x^2} - \frac{1}{2} \left[\frac{\kappa'}{\kappa} \left(\frac{\kappa}{\kappa'} \right)' \right](t) \frac{\partial u_a}{\partial x} x.$$

З а м е ч а н и е 2. В условиях теоремы 5.3 $\theta(t, \xi) \rightarrow f_3(\xi)$ при $t \rightarrow +\infty$ в норме $L^2(\mathbf{R}_+^1)$, причем справедлива оценка

$$\|\theta(t, \xi) - f_3(\xi)\|_2 = O \left\{ \left[\kappa \left(\frac{\kappa}{\kappa'} \right)^{1/4} \right]^{-1}(t) \int_1^t \kappa(\tau) \left| \left[\left(\frac{\kappa}{\kappa'} \right)^{1/4} \right]'(\tau) \right| d\tau \right\} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0.$$

Сформулированная теорема доказывается так же, как предыдущая.

Ниже приведена таблица 9, в которой указаны функции $\Phi(t)$ некоторых п. а. р. уравнения (5.1), определяющих асимптотическое поведение решения задачи (5.1), (5.2) при различных граничных законах $\kappa(t)$. Отметим, что в рассматриваемых случаях точных инвариантных решений задача (5.1), (5.2) не имеет (см. [17]).

2. Линейное уравнение (5.1) допускает сразу два различных класса п. а. р. (см. § 4 и п. 1 в § 5). Ниже проведено сопоставление различных п. а. р., отвечающих одним и тем же граничным режимам.

Функция E в (4.3), с помощью которой определялся конкретный вид «вырожденных» п. а. р., в данном случае (при $k \equiv 1$) имеет вид

$$E(s) = \exp(s) - 1, \quad s > 0.$$

Мы будем сравнивать п. а. р., отвечающие граничным режимам без обострения.

2.1. Сравнение п. а. р. типа А (§ 4) и III (§ 5). П. а. р. типа А (см. § 4) определены для граничных режимов

$$\kappa(t) = \exp[\psi(t)] - 1 \cong \exp[\psi(t)], \quad t \rightarrow +\infty \quad (5.26)$$

(здесь и далее индекс «+» у функций κ_+ , ψ_+ для простоты опускаем), где функция ψ удовлетворяет условию (см. (4.27))

$$\left[\frac{\psi}{\psi'} \right]'(t) \rightarrow \frac{1}{m}, \quad t \rightarrow +\infty, \quad m > 0, \quad (5.27)$$

и имеют вид (4.15)

$$u_a^*(t, x) = \exp[\psi(t)\theta_a(\xi)] - 1 \cong \exp[\psi(t)\theta_a(\xi)]. \quad (5.28)$$

Здесь $\xi = x/\varphi(t)$, где φ вычисляется по формуле (4.28), функция $\theta_a(\xi)$ удовлетворяет уравнению (4.10).

Очевидно, что при выполнении условия (5.27) имеет место (5.23).

Таблица 9

$\kappa(t)$	$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{\kappa}{\kappa'} \right)'(t)$	$\Phi(t)$
$\ln^\alpha \ln(3+t), \alpha > 0$	$+\infty$	$t^{1/2}$
$\ln^\alpha(1+t), \alpha > 0$	$+\infty$	$t^{1/2}$
$\exp[\ln^\alpha(1+t)], 0 < \alpha < 1$	$+\infty$	$t^{1/2}$
$\exp \left[\frac{\ln(1+t)}{\ln^\alpha \ln(3+t)} \right], \alpha > 0$	$+\infty$	$t^{1/2}$
$t^m \ln^\alpha(3+t), m > 0$	$1/m$	$t^{1/2}$
$t^m \exp[\ln^\alpha(1+t)], m > 0, 0 < \alpha < 1$	$1/m$	$t^{1/2}$
$\exp[\ln^\alpha(1+t)], \alpha > 1$	0	$\cong (\alpha^{-1} t \ln^{1-\alpha} t)^{1/2}$
$\exp(t^\alpha), \alpha > 0$	0	$(\alpha^{-1} t^{1-\alpha})^{1/2}$
$\exp(\exp t)$	0	$\exp(-t/2)$
$\exp(t^\alpha), \alpha > 0$	0	$\cong (\alpha t^\alpha t^{\alpha-1} \ln t)^{1/2}$

Действительно, в силу (5.27)

$$\left[\frac{\kappa(t)}{\kappa'(t)} \right]' \cong \left(\frac{1}{\psi'} \right)'(t) = \frac{1}{\psi(t)} \left[\left(\frac{\psi}{\psi'} \right)'(t) - 1 \right] \rightarrow 0$$

при $t \rightarrow +\infty$. Значит, для граничных режимов (5.26), (5.27) определены п. а. р. типа III (см. теорему 5.3). Они имеют вид

$$u_a(t, x) = \kappa(t) f_3(\xi).$$

В силу (5.9) и (5.26) при достаточно больших t имеем

$$u_a(t, x) \cong \exp[\psi(t) - \xi], \quad \xi = \frac{x}{\Phi(t)}; \quad (5.29)$$

функция $\Phi(t)$ указана в (5.24). Перепишем (5.29) так:

$$u_a(t, x) = \exp\left\{\psi(t) \left[1 - \frac{\xi}{\psi(t)}\right]\right\}. \quad (5.29')$$

В силу (5.24) имеем $\Phi(t)\psi(t) \cong [\psi^2(t)/\psi'(t)]^{1/2}$ и поэтому

$$\frac{\xi}{\psi(t)} = \frac{x}{\Phi(t)\psi(t)} \cong m^{1/2}\xi.$$

Следовательно, (5.29) можно записать так:

$$u_a(t, x) \cong \exp\{\psi(t)[1 - m^{1/2}\xi]\}, \quad \xi = \frac{x}{\psi(t)}. \quad (5.30)$$

Сопоставим функции (5.28) и (5.30). Нетрудно видеть, что (5.30) является лишь первым приближением п. а. р. (5.28). В этом можно убедиться, подставляя в (5.28) разложение функции $\theta_a(\xi)$ в степенной ряд при малых $\xi > 0$

$$\theta_a(\xi) = 1 - m^{1/2}\xi + \dots,$$

который выводится из уравнения (4.10).

2.2. Сравнение п. а. р. типа В (§ 4) и III (§ 5). Сопоставление указанных п. а. р. проводится аналогичным образом. Здесь п. а. р. типа В имеют вид

$$u_a^*(t, x) = \exp[\psi(t)\theta_a(\xi)] - 1 \cong \exp[\psi(t)\theta_a(\xi)], \quad (5.31)$$

где $\xi = x/\psi(t)$ и функция θ_a удовлетворяет уравнению (4.12). П. а. р. типа III можно записать следующим образом:

$$u_a(t, x) \cong \exp[\psi(t)(1 - \xi)], \quad \xi = \frac{x}{\varphi(t)}. \quad (5.32)$$

Функция $\varphi(t)$ в (5.31) и (5.32) вычисляется по формуле (4.50). Учитывая, что (см. уравнение (4.12)) $\theta_a(\xi) = 1 - \xi + \dots$ при малых $\xi > 0$, получаем, что (5.32) является первым приближением п. а. р. (5.31).

Таким образом, «вырожденные» п. а. р., построенные в § 4, по-видимому, более точно указывают профиль тепловой волны по сравнению с п. а. р. (5.10). Отметим, что глубины проникновения волны, полученные с помощью этих п. а. р., асимптотически эквивалентны (ср. (4.22) и (5.12)). Подчеркнем, что «вырожденным» п. а. р. отвечает более сложный по сравнению с (5.11) тип автомодельного представления, а также принципиально иной способ доказательства сходимости.

§ 6. Направления дальнейших исследований

1. В [1] и настоящей работе построены широкие системы п. а. р. уравнений типа (1) с коэффициентами $k(u)$, принадлежащими двум классам функций:

1) Степенные функции $k(u)$ (§ 2 в [1]) и «близкие» к ним (§ 3 в [1]), когда $(k/k')(u) \rightarrow 1/\sigma$, $u \rightarrow +\infty$; $\sigma > 0$.

2) Функции $k(u)$, удовлетворяющие условиям (4.1), (4.2) (см. § 4), когда $(k/k')(u) \rightarrow \infty$, $u \rightarrow +\infty$.

Функции $k(u)$ из первого класса растут при $u \rightarrow +\infty$ быстрее и лежат «выше» любых функций из второго класса. Особо отметим, что указанные классы функций «плотно прилегают» друг к другу. Другими словами, не существует функции $k(u)$, лежащей между ними, т. е. растущей при $u \rightarrow +\infty$ медленнее любой степенной и быстрее любой функции из второго класса. Это наглядно видно на примере семейства функций $k(u) = \exp[\ln^\alpha(1+u)]$ — при $\alpha=1$ $k(u)$ принадлежит первому, а при $\alpha \in (0, 1)$ — второму классу (см. таблицу 8).

Таким образом, осталось рассмотреть коэффициенты k , удовлетворяющие условию

$$3) (k/k')(u) \rightarrow 0, \quad u \rightarrow +\infty$$

(например, $k(u) = \exp[\ln^\alpha(1+u)]$, $\alpha > 1$; $k(u) = \exp(u^\lambda)$, $\lambda > 0$, и т. д.). Полные системы п. а. р. уравнений (1) с такими коэффициентами будут построены в следующей работе того же названия.

2. Полученные в работе результаты позволяют эффективно строить п. а. р. широкого класса квазилинейных параболических уравнений типа нелинейной теплопроводности с источником

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(u) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + Q(u), \quad t > 0, \quad x \in \mathbf{R}^1. \quad (6.1)$$

Здесь $Q(u) > 0$ при $u > 0$ — мощность объемных источников тепла, зависящих от температуры. Групповая классификация уравнения (6.1), проведенная в [10], показывает, что класс всех интересующих нас инвариантных решений уравнения (6.1) при произвольных функциях k, Q весьма узок. Между краевой задачей для уравнения (1) и задачей Коши для уравнения (6.1) существует непосредственная качественная связь: граничный режим в первой из них можно моделировать действующим в окрестности точки $x=0$ источником тепла¹⁰. Поэтому выбирая соответствующим образом зависимость $Q(u)$, можно добиться нужного «граничного» режима при $x=0$, и тогда пространственно-временная структура п. а. р. уравнения (1) подскажет вид п. а. р. уравнения (6.1).

Указанным способом в работах [6], [13] были построены п. а. р. $u_a(t, x)$ уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (1+u) \ln^\beta(1+u), \quad t > 0, \quad x \in \mathbf{R}^1 \quad (6.2)$$

(здесь $\beta = \text{const} > 1$), удовлетворяющие нелинейному уравнению первого порядка

$$\frac{\partial u_a}{\partial t} = \frac{1}{(1+u_a)} \left(\frac{\partial u_a}{\partial x} \right)^2 + (1+u_a) \ln^\beta(1+u_a).$$

Эти п. а. р. являются неограниченными (режимами с обострением) и возрастают до бесконечности в течение конечного времени. В то же время при $\beta > 3$ и достаточно малых начальных функциях задача Коши для уравнения (6.2) допускает глобальные решения. Соответствующие им п. а. р. удовлетворяют уравнению такого вида ([6], [13]):

$$\frac{\partial u_a}{\partial t} = \frac{\partial^2 u_a}{\partial x^2} - \frac{1}{(1+u_a)} \left(\frac{\partial u_a}{\partial x} \right)^2 + (1+u_a) \ln^\beta(1+u_a).$$

¹⁰ Эта идея была предложена и использовалась в работах [11], [12] для вывода различного рода качественных оценок решения уравнения (6.1) со степенными нелинейностями.

Таким образом, уравнение (6.2) обладает любопытной особенностью: два вида его решений асимптотически сходятся к п. а. р.¹¹, удовлетворяющим двум различным уравнениям разных порядков.

Построение широких классов п. а. р. параболических уравнений типа (6.1) достаточно общего вида будет проведено в последующих публикациях (один класс таких п. а. р. указан в [18]).

Обзор и список литературы, связанной с исследованием процессов, описываемых уравнениями (6.1), и эффекта локализации горения в нелинейных средах, даны в [14].

Литература

1. Галактионов В. А., Самарский А. А. Методы построения приближенных автомодельных решений нелинейных уравнений теплопроводности. I — Матем. сб., 1982, т. 118 (160), с. 292—322.
2. Кружков С. Н. Обобщенные решения нелинейных уравнений первого порядка и некоторые задачи для квазилинейных параболических уравнений.— Вестн. МГУ, мат. мех., 1964, № 6, с. 65—74.
3. Кружков С. Н. Нелокальная теория уравнений Гамильтона — Якоби. Труды Всесоюз. конф. по уравн. с частн. произв., посв. 75-летию акад. И. Г. Петровского. М.: Изд-во МГУ, 1978, с. 137—140.
4. Галактионов В. А. О приближенных автомодельных решениях уравнений типа нелинейной теплопроводности.— Дифф. уравнения, 1980, т. 16, № 9, с. 1660—1676.
5. Галактионов В. А., Курдюмов С. П., Михайлов А. П., Самарский А. А. Действие граничных режимов с обострением на среду с постоянной теплопроводностью. Препринт ИПМ АН СССР. № 28, М.: ИПМ, 1979.
6. Самарский А. А. О новых методах исследования асимптотических свойств параболических уравнений.— Труды Матем. ин-та им. В. А. Стеклова АН СССР, 1981, т. 158, с. 153—162.
7. Самарский А. А., Галактионов В. А., Курдюмов С. П., Михайлов А. П. Локализация процессов диффузии в средах с постоянными свойствами.— ДАН СССР, 1979, т. 247, № 2, с. 349—352.
8. Галактионов В. А. Приближенные автомодельные решения уравнения теплопроводности.— ДАН СССР, 1982.
9. Овсянников Л. В. Групповые свойства уравнения нелинейной теплопроводности.— ДАН СССР, 1959, т. 125, № 3, с. 492—495.
10. Дородницын В. А. Групповые свойства и инвариантные решения уравнения нелинейной теплопроводности с источником или стоком. Препринт ИПМ АН СССР. № 57, М.: ИПМ, 1979.
11. Курдюмов С. П. Локализация диффузионных процессов и возникновение структур при развитии в диссипативной среде режимов с обострением: Дисс. на соискание уч. ст. докт. физ.-матем. наук: М.: Институт прикл. матем. им. М. В. Келдыша АН СССР, 1979.
12. Змитренко Н. В., Курдюмов С. П., Михайлов А. П., Самарский А. А. Возникновение структур в нелинейных средах и нестационарная термодинамика режимов с обострением. Препринт ИПМ АН СССР. № 74, М.: ИПМ, 1976.
13. Галактионов В. А., Курдюмов С. П., Михайлов А. П., Самарский А. А. О неограниченных решениях полулинейных параболических уравнений. Препринт ИПМ АН СССР. № 161, М.: ИПМ, 1979.
14. Галактионов В. А., Курдюмов С. П., Михайлов А. П., Самарский А. А. Локализация тепла в нелинейных средах.— Дифф. уравнения, 1981, т. 17, № 10, с. 1826—1841.
15. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1972.
16. Никифоров А. Ф., Уваров В. Б. Специальные функции математической физики. М.: Наука, 1978.
17. Lie S. Über die integration durch bestimmte integrale von einer classer linearer partiellen differentialgleichungen.— Arch. Math., 1881, v. 6, p. 328—368.
18. Галактионов В. А. Об условиях локализации неограниченных решений квазилинейных параболических уравнений.— ДАН СССР, 1982, т. 264, № 5.

Институт прикладной математики
им. М. В. Келдыша АН СССР

Поступила в редакцию
21.1.1982

¹¹ Отметим, что только при $\beta=0$ или 1 задача Коши для уравнения (6.2) имеет подходящие инвариантные решения, см. [10].